ANALISI MATEMATICA I - CORSO DI LAUREA IN FISICA

LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI

prof. Antonio Greco

20 NOVEMBRE -
3 DICEMBRE 2020

8 LEZIONI (16,7 %)

LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI

Ricordiamo innanzitutto che il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

prescinde completamente dal valore di

$$f(x_0)$$

anzi, il punto x_0 può anche non appartenere al dominio della funzione f .

Se però tale punto appartiene al dominio della funzione, possiamo confrontare

$f(x_0)$ con il limite (se esiste)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

Consideriamo separatamente il limite destro ed il limite sinistro.

CONSIDERIAMO UNA $f: [x_0, b) \rightarrow \mathbb{R}$

SE ESISTE FINITO IL LIMITE DESTRO

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x),$$

e se il limite destro coincide con il valore di

$f(x_0)$, si dice che la funzione è CONTINUA

DA DESTRA nel punto x_0 .

ESEMPIO: $f(x) = [x]$, $x_0 \in \mathbb{R}$

SI TROVA CHE $\lim_{x \rightarrow x_0^+} [x] = [x_0]$.

INFATTI, (SE $x_0 \in \mathbb{Z}$ SI HA CHE $[x] = [x_0] = x_0$ PER OGNI $x \in [x_0, x_0+1)$

SE, INVECE, $x_0 \notin \mathbb{Z}$, ALLORA SCRIVIAMO

$$[x_0] \leq x_0 < [x_0] + 1.$$

MA ALLORA, PER OGNI $x \in [x_0, [x_0] + 1)$

SI HA $[x] = [x_0]$ E LA TESI SEGUE.

CONSIDERIAMO UNA $f: (a, x_0] \rightarrow \mathbb{R}$

SE ESISTE FINITO IL LIMITE SINISTRO

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x),$$

e se il limite ~~destro~~ ^{SINISTRO} coincide con il valore di

$f(x_0)$, si dice che la funzione è CONTINUA

^{SINISTRA} DA ~~DESTRA~~ nel punto x_0 .

1) Per quanto visto nelle scorse lezioni, è immediato constatare che:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 + 1) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 - 4x^3) = \mp\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 + 1) = \pm\infty$$

2) Per quanto visto la scorsa lezione, si riconosce immediatamente che:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2 + 1} = 0.$$

A questo proposito ci si può chiedere se la funzione

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

assume valori positivi o negativi. Per rispondere, studiamo la disequazione

$$\frac{2x}{x^2 + 1} > 0.$$

Siccome il denominatore

$$x^2 + 1$$

soddisfa per ogni x reale la relazione

$$x^2 + 1 \geq 1 > 0,$$

la disuguaglianza

$$\frac{2x}{x^2 + 1} > 0$$

equivale a $x > 0$.

Quindi la funzione $f(x)$ ha il segno di x , cioè è positiva per $x > 0$, nulla per $x = 0$, e negativa per $x < 0$, e perciò possiamo scrivere

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2 + 1} = 0^{\pm}.$$

Cerchiamo ora il limite

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 4x^3}{x^2 + 1}.$$

Per quanto visto la scorsa lezione, si riconosce immediatamente che:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 4x^3}{x^2 + 1} = \mp\infty.$$

Infine, si trova:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 4x^3}{x^3 + 1} = -4$$

Infatti si ha che:

$$\frac{x^2 - 4x^3}{x^3 + 1} = \frac{\frac{1}{x} - 4}{1 + \frac{1}{x^3}}$$

PER OGNI $x \neq 0$:

$$\text{SICCOME } \frac{1}{x} - 4 \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} -4$$

$$\text{E } 1 + \frac{1}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 1,$$

L'ALTESI SEGUE.

3) Seguendo il suggerimento, scriviamo:

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+1} - mx &= \\ &= \frac{\left(\sqrt{x^2+1} - mx\right) \sqrt{x^2+1} + mx}{\sqrt{x^2+1} + mx} \\ &= \frac{\left(\sqrt{x^2+1} - mx\right) \left(\sqrt{x^2+1} + mx\right)}{\sqrt{x^2+1} + mx} \end{aligned}$$

$$= \frac{x^2+1 - (mx)^2}{\sqrt{x^2+1} + mx} = \frac{(1-m^2)x^2 + 1}{\sqrt{x^2+1} + mx}$$

Si vede fin dall'inizio che, se m è negativo o nullo, si ha

$$\sqrt{x^2+1} - mx \geq \sqrt{x^2+1} \text{ PER } x > 0$$

QUINDI

$$\sqrt{x^2+1} - mx > \sqrt{x^2} = |x| = x$$

$$\text{E PERCIÒ } \sqrt{x^2+1} - mx \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Pertanto prenderemo m positivo. Ma allora

$$\sqrt{x^2+1} + mx \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

In conclusione, prendendo $m = 1$ si ha

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+1} - mx &= \sqrt{x^2+1} - x = \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Dunque il valore $m = 1$ risolve il problema.

Osservazione: il procedimento seguito si basa sull'uguaglianza

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{x^2+1} + x\right) \left(\sqrt{x^2+1} - x\right) &= \\ &= x^2+1 - x^2 = 1 \text{ E QUINDI} \\ \sqrt{x^2+1} + x &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \end{aligned}$$

Interpretazione grafica

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} \quad \bar{E}$$

UNA FUNZIONE PARI PERCHÉ

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 1} =$$

$$= \sqrt{x^2 + 1} = f(x),$$

E INOLTRE $f(0) = 1$ E

SI HA $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x|$

QUINDI $\sqrt{x^2 + 1} > |x| \geq x$

PER OGNI $x \in \mathbb{R}$: IL GRAFICO DI $f(x)$ GIACE ALDISOPRA DI QUELLO DI $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

Il grafico di $f(x)$ è una curva nota dall'antichità: è un ramo di iperbole.

Il fatto che la differenza $f(x) - y(x)$, dove $y(x) = x$, tenda a zero per $x \rightarrow +\infty$ si esprime dicendo che la retta di equazione $y = y(x)$ è un ASINTOTO per la funzione $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$

ASINTOTI ALL'INFINITO

DATA UNA $f: (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, OVV-
VERO UNA $f: (-\infty, b) \rightarrow \mathbb{R}$

CI CHIEDIAMO SE ESISTONO m, q
TALI CHE RISULTI

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - y(x)) = 0,$$

DOVE $y(x) = mx + q$. SCRIVIAMO AL-
LORA

$$f(x) - mx - q = x \left(\frac{f(x)}{x} - m - \frac{q}{x} \right)$$

E OSSERVIAMO CHE $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{q}{x} = 0$. QUIN-

DI È NECESSARIO CHE IL RAPPORTO $\frac{f(x)}{x}$

ABBIA LIMITE FINITO: CONDIZIONE NECESSARIA AFFINCHÉ $f(x)$ ABBIA UN ASINTOTO

PER $x \rightarrow \pm\infty$ È CHE IL LIMITE DI $\frac{f(x)}{x}$ PER $x \rightarrow \pm\infty$ ESISTA FINITO. IN TAL CASO,

PONIAMO

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

A QUESTO PUNTO, È NECESSARIO E SUFFICIENTE CHE $f(x) - mx$ ABBIA LIMITE FINITO. SE ANCHE QUESTO AVVIENE,

PONIAMO $q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx)$ E

LA RETTA $y = mx + q$ È L'ASINTOTO DI $f(x)$ PER $x \rightarrow \pm\infty$.

Esempio: nella lezione del 25 novembre abbiamo verificato che la retta di equazione $y = x$ è un asintoto per la funzione $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ PER $x \rightarrow +\infty$.

Esempio: per parità, si può affermare che la retta $y = -x$ è un asintoto per la stessa $f(x)$ per $x \rightarrow -\infty$

ASINTOTI ORIZZONTALI

L'ASINTOTO SI DICE ORIZZONTALE SE $m=0$.
CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE AFFINCHÉ $f(x)$ ABBAIA UN ASINTOTO ORIZZONTALE PER $x \rightarrow \pm\infty$ È CHE IL LIMITE DI $f(x)$ ESISTA FINITO. IN TAL CASO L'ASINTOTO HA EQUAZIONE $y=q$ CON $q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

ESEMPIO: la retta di equazione $y = 0$ (l'asse x) è un asintoto orizzontale per la funzione $f(x) = 1/x$ per $x \rightarrow +\infty$ E PER $x \rightarrow -\infty$ (VEDERE LA LEZIONE DEL 10 NOVEMBRE)

ASINTOTI VERTICALI

SE RISULTA, CON UNA QUALUNQUE SCELTA DEI SEGNI,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty$$

SI DICE CHE LA RETTA $x = x_0$ È UN ASINTOTO VERTICALE.

ESEMPIO: LA FUNZIONE $f(x) = \frac{1}{x}$ HA UN ASINTOTO VERTICALE DI EQUAZIONE $x = 0$

Problema n. 4, serie [203]

PER QUANTO VISTO IL 20/11,

$$\boxed{\text{SE } x_0 \in \mathbb{Z}, \text{ ALLORA } [x]}$$

$$= x_0 - 1 \text{ PER OGNI } x$$

$$\in [x_0 - 1, x_0) \text{ QUINDI}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} [x] = x_0 - 1 \neq [x_0]$$

QUINDI LA FUNZIONE

$[x]$ È DISCONTINUA

DA SINISTRA IN $x_0 \in \mathbb{Z}$.

RESTA DA STUDIARE
IL CASO $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.
IN TAL CASO SI HA

$$[x_0] < x_0 < [x_0] + 1$$

MA ALLORA, PER O-
GNI $x \in [x_0, x_0)$

$$\text{RISULTA } [x] = [x_0]$$

E PERCIÒ:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} [x] = [x_0]$$

IN CONCLUSIONE, LA
FUNZIONE $f(x) = [x]$
È CONTINUA DA SINI-
STRA IN UN PUNTO x_0
SE E SOLO SE $x_0 \notin \mathbb{Z}$,
DOVE IL SIMBOLO $\mathbb{Z}$ VIE-
NE DA TEDESCO ZAHLEN,
CHE VUOL DIRE NUMERI,
ED È STATO SCELTO DAL
GRUPPO BOURBAKI PER
DENOTARE L'INSIEME
DEI NUMERI INTERI
(RELATIVI).

In generale, le rappresen-
tazioni grafiche sono utili ed
efficaci, ma non costituisco-
no dimostrazione nel senso
moderno del termine.

INSIEME AL SIMBO-
LO $\mathbb{Z}$, SI DEVONO
AL GRUPPO BOURBAKI
ANCHE I SIMBOLI $\mathbb{N}$,
 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\emptyset$,
CHE DENOTANO, RI-
SPETTIVAMENTE, L'IN-
SIEME DEI NUMERI NA-
TURALI, RAZIONALI,
REALI, COMPLESSI,
E L'INSIEME VUOTO,
CHE È L'INSIEME CHE
NON HA ELEMENTI.

LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE

Gli studi sulla continuità, e perfino la definizione, sono stati sviluppati nell'Ottocento, in particolare ad opera di Karl Weierstrass. Si tenga presente che, invece, il calcolo differenziale fu inventato nel Seicento.

DEFINIZIONE: UNA FUNZIONE $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ SI DICE CONTINUA IN UN PUNTO $x_0 \in (a, b)$ SE IN TALE PUNTO ESSA È CONTINUA SIA DA DESTRA CHE DA SINISTRA, OVVERO SE RISULTA

$$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

Esempio.

Per quanto visto nella lezione del 20 novembre, la funzione $f(x) = [x]$ (parte intera di x) è discontinua in tutti i punti di ascissa intera.

Le funzioni di uso corrente risultano continue per effetto dei teoremi sui limiti.

Esempio: la funzione $f(x) = x$ è continua in ogni punto.

VERIFICA (CON LA DEFINIZIONE DI LIMITE):

FISSATO UN PUNTO x_0 , SI HA CHE

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

PERCHÉ $|f(x) - l| =$

$$= |x - x_0| < \epsilon \text{ PER}$$

OGNI $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

CON $\delta = \epsilon$

Esempio: la funzione $f(x) = x^2$ è continua perché possiamo scrivere:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = \lim_{x \rightarrow x_0} x \cdot x$$

$$= x_0^2$$

Per una ragione analoga, tutte le funzioni potenza $f(x) = x^n$ sono continue per ogni n intero positivo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = \lim_{x \rightarrow x_0} x \cdot \dots \cdot x$$

$$= x_0^n = f(x_0)$$

Più in generale, qualunque polinomio

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

è una funzione continua su tutto l'asse reale.

DEFINIZIONE: una funzione $f(x)$ si dice CONTINUA NELL'INTERVALLO (a,b) se essa è continua in ciascun punto di tale intervallo.

Se $P(x)$ è un qualunque polinomio, la funzione $f(x) = 1/P(x)$ è continua in tutti i punti del suo insieme di definizione, cioè in tutti i punti x_0 tali che $P(x_0) \neq 0$. INFATTI SI HA CHE

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{P(x)} = \frac{1}{P(x_0)}$$

per la continuità del polinomio $P(x)$ e per il teorema sul limite del rapporto.

Per una ragione analoga, le funzioni razionali $Q(x)/P(x)$ risultano continue in ciascun punto che non sia una radice di $P(x)$.

Teorema: date due funzioni $f(x)$ e $g(x)$, continue in un punto x_0 , la funzione somma $f(x) + g(x)$, la funzione differenza $f(x) - g(x)$ e la funzione prodotto $f(x)g(x)$ sono anch'esse continue in x_0 . Inoltre, se $g(x_0)$ è diversa da 0, allora anche la funzione $f(x)/g(x)$ è continua in x_0 . Infine, se $g(x_0) > 0$, allora anche la funzione

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)^{f(x)}$$

È CONTINUA NEL PUNTO x_0 .

QUESTO TEOREMA DISCENDE DAI TEOREMI SUI LIMITI ENUNCIATI IL 12 NOVEMBRE. VERIFICHIAMO, AD ESEMPIO, LA CONTINUITA' DELLA FUNZIONE

$$f(x) + g(x).$$

PER IPOTESI, SI HA CHE

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = l_1 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0) = l_2 \in \mathbb{R}$$

QUINDI, PER IL TEOREMA SUL LIMITE DELLA SOMMA,

POSSIAMO SCRIVERE

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) &= l_1 + l_2 \\ &= (f + g)(x_0). \end{aligned}$$

LA PROPRIETÀ DI CONTINUITÀ DELLA FUNZIONE $(g(x))^{f(x)}$, CON f E g CONTINUE E $g > 0$, CONTIENE COME CASI PARTICOLARI MOLTE IMPORTANTI PROPRIETÀ DI CONTINUITÀ. VEDIAMONE ALCUNE.

1) LA CONTINUITÀ DELLA FUNZIONE ESPONENZIALE: POSTO $g(x) = e$ (COSTANTE) E $f(x) = x$, SI HA CHE LA FUNZIONE $(g(x))^{f(x)} = e^x$ È CONTINUA IN OGNI $x_0 \in \mathbb{R}$.

PER INCISO, SI NOTI CHE LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI COSTANTI $f(x) = c$ SEGUE IMMEDIATAMENTE DAL FATTO CHE $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$ PER OGNI $x_0 \in \mathbb{R}$.

SIMILMENTE, SI RICAVA LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 2^x , 10^x , E, IN GENERALE, b^x CON UN QUALUNQUE $b > 0$.

2) PONENDO $f(x) = \alpha \in \mathbb{R}$ (COSTANTE) E $g(x) = x$ SI

HA LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI POTENZA x^α COME AD ESEMPIO x^2 MA ANCHE $x^{-1} = \frac{1}{x}$ E $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ PER n INTERO POSITIVO E $x > 0$.

LA CONTINUITÀ PER $x < 0$ SI PUÒ VERIFICARE COL CAMBIAMENTO DI VARIABILE $x = -t$.

ESEMPIO: CERCHIAMO IL LIMITE

$$\lim_{x \rightarrow x_1} \frac{1}{x}, \text{ con } x_1 < 0.$$

POSTO $x = -t$, E $t_1 = -x_1 > 0$

IL LIMITE DIVENTA

$$\lim_{t \rightarrow t_1} \frac{1}{-t} = - \lim_{t \rightarrow t_1} \frac{1}{t} = - \frac{1}{t_1} =$$

$$= \frac{1}{x_1}, \text{ RISULTATO CHE}$$

SI PUÒ ANCHE RICAVARE

DIRETTAMENTE DAL TEOREMA

SUL LIMITE DEL

RAPPORTO.

NELLA FAMIGLIA DELLE

FUNZIONI POTENZA x^α

RIENTRANDO ANCHE

$x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ E, PIÙ IN

GENERALE, $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$.

PROBLEMA: x^α , $\alpha > 0$,

È CONTINUA IN $x_0 = 0$?

Possiamo rispondere affermativamente applicando le conoscenze in nostro possesso. Possiamo infatti verificare che, posto

$$f(x) = x^\alpha, \text{ SI HA:}$$

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Il primo membro si scrive immediatamente:

$$f(0) = 0^\alpha = 0, \text{ PER } \alpha > 0.$$

Resta da verificare che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0.$$

Usiamo la definizione di limite:

preso $\varepsilon > 0$, CERCHIAMO

$\delta > 0$ TALE CHE

LE DISUGUAGLIANZE

$$- \varepsilon < x^\alpha < \varepsilon$$

VALGANO PER OGNI

$x \in (0, \delta)$.

LA PRIMA DISUGUAGLIANZA È OVVIAMENTE SODDISFATTA PERCHÉ

$$- \varepsilon < 0 < x^\alpha$$

PER OGNI $x > 0$.

INOLTRE, LA DISUGUAGLIANZA $x^\alpha < \varepsilon$

EQUIVALE A $x < \varepsilon^{1/\alpha}$

PER LA STRETTA MONOTONIA DELLE FUNZIONI POTENZA CON ESPONENTE

POSITIVO (17 NOVEMBRE).

QUINDI BASTA PRENDERE

$$\delta = \varepsilon^{1/\alpha}.$$

Teoremi sulla continuità legati alla completezza dell'insieme $\mathbb{R}$

1 E 2: TEOREMA DEGLI ZERI E TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI.

TEOREMA DEGLI ZERI:

CONSIDERIAMO UNA FUNZIONE $f \in C^0([a, b])$,
ESSENDO $C^0([a, b])$ L'IN-

SIEME DI TUTTE LE FUNZIONI $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ CONTINUE IN OGNI $x_0 \in [a, b]$.

SE I VALORI DI $f(x)$ AGLI ESTREMI SONO DISCORDI, CIOÈ SE

$$f(a) \cdot f(b) < 0,$$

ALLORA LA FUNZIONE f POSSIEDE ALMENO UNO ZERO, CIOÈ ESISTE ALMENO UN PUNTO $x_0 \in (a, b)$ TALE CHE $f(x_0) = 0$.

TALI PUNTI SI DICONO ZERI DELLA FUNZIONE f .

TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI

SE $f \in C^0([a, b])$, E SE $f(a) < f(b)$, ALLORA PER OGNI $y \in (f(a), f(b))$ ESISTE ALMENO UN $x \in (a, b)$ TALE CHE $f(x) = y$.

OSSERVAZIONE: IL TEOREMA DEGLI ZERI È UN CASO PARTICOLARE DEL TEOREMA DEI VALORI INTERMEDII:

INFATTI, SE $f \in C^0([a, b])$ SODDISFA $f(a) \cdot f(b) < 0$,

ALLORA IL VALORE $y = 0$ È UN VALORE INTERMEDIO FRA

$f(a)$ E $f(b)$ E QUINDI, PER

IL TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI, ESISTE ALMENO UN

$x_0 \in (a, b)$ TALE CHE $f(x_0) =$

0 E QUINDI SI DEDUCE LA TESI DEL TEOREMA DEGLI ZERI.

VICEVERSA, SI PUÒ RICAVARE IL TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI DAL TEOREMA DEGLI ZERI:

PRESA $f \in C^0([a, b])$ CON $f(a) < f(b)$ E FISSATO $y \in (f(a), f(b))$,

APPLICHIAMO IL TEOREMA DEGLI ZERI ALLA FUNZIONE $f(x) - y$:

SI HA $f(a) - y < 0$

E $f(b) - y > 0$ QUINDI ESISTE

$x_0 \in (a, b)$ TALE CHE

$f(x_0) - y = 0$, CIOÈ $f(x_0) = y$.

DMOSTRAZIONE DEL TEOREMA DEGLI ZERI: PRENDIAMO $f \in C^0([a, b])$ E SUPPONIAMO CHE

$f(a) < 0 < f(b)$. DEFINIAMO PER RICORRENZA LE SUCCESSIONI (a_n) , (b_n) E (μ_n)

(M1) PONENDO: $a_0 = a$, $b_0 = b$

E, PER OGNI $n \geq 0$, $\mu_n = \frac{a_n + b_n}{2}$,

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n, & \text{SE } f(\mu_n) \geq 0, \\ \mu_n, & \text{SE } f(\mu_n) < 0 \end{cases}$$

COSICCHÉ $f(a_n) < 0$ PER OGNI n ;

$$b_{n+1} = \begin{cases} \mu_n, & \text{SE } f(\mu_n) \geq 0 \\ b_n, & \text{SE } f(\mu_n) < 0 \end{cases}$$

COSICCHÉ RISULTA $f(b_n) \geq 0$ PER OGNI n (PROCEDIMENTO PER BISEZIONE). ESSENDO $a_n \leq a_{n+1}$ E

$b_{n+1} \leq b_n$, PER LA COMPLETEZZA

ESISTONO I LIMITI

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_1, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = l_2.$$

MA SICCOME $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$

VUOL DIRE CHE $l_1 = l_2$. VERIFICHIAMO CHE, POSTO $x_0 = l_1$, SI HA

$f(x_0) = 0$.

$f(x_0) = 0$.

ESSENDO f CONTINUA, SI HA

$$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

DAL FATTO CHE $a_n \rightarrow x_0$

SEGUE ALLORA $f(a_n) \rightarrow f(x_0)$

MA SICCOME $f(a_n) < 0$ PER
OGNI n , PER IL TEOREMA DEL-
LA PERMANENZA DEL SEGNO

POSSIAMO SCRIVERE $f(x_0) \leq 0$.

ANALOGAMENTE, DA $b_n \rightarrow x_0$

SEGUE $f(b_n) \rightarrow f(x_0)$ E SIC-

COME $f(b_n) \geq 0$ SI HA

$f(x_0) \geq 0$. QUINDI DEVE A-

VERSI $f(x_0) = 0$ COME VO-
LEVASI DIMOSTRARE.

3. CON LA STESSA TECNICA DI BI-
SEZIONE SI PUÒ DIMOSTRARE IL TEO-

REMA DI WEIERSTRASS: SE $f \in$
 $C^0([a, b])$ ALLORA ESISTONO ALMENO

UN PUNTO $x_1 \in [a, b]$ ED ALMENO UN
PUNTO $x_2 \in [a, b]$ TALI CHE

$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ PER OGNI $x \in$

$[a, b]$. SI SCRIVE: $\max_{[a, b]} f(x) = f(x_2)$

E $\min_{[a, b]} f(x) = f(x_1)$.

OSSERVAZIONE: LA FORMULA

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$$

SI DIMOSTRA PER INDUZIONE. BA-
SE DELL'INDUZIONE È IL CASO

$n=0$: IN TAL CASO SI HA

$$b_0 - a_0 = b - a$$

E QUESTO È VERO PER LA DEFINI-
ZIONE DI $a_0 = a$ E $b_0 = b$.

PASSO INDUTTIVO: SUPPONIAMO CHE

RISULTI $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ PER UN

PARTICOLARE VALORE DI n , E OSSER-
VIAMO CHE PER COSTRUZIONE SI HA

$$\begin{aligned} b_{n+1} - a_{n+1} &= \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{1}{2} \frac{b-a}{2^n} \\ &= \frac{b-a}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

Applicazione: definizione della funzione logaritmica.

RICORDIAMO INVANZITUTTO CHE

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty$$

(LEZIONE DEL 18 NOVEMBRE).

INOLTRE SI HA

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^t} = 0 \end{aligned}$$

(VEDERE LA LEZIONE DEL 17/11), E
SAPPIAMO CHE LA FUNZIONE

$f(x) = e^x$ È STRETTAMENTE
CRESCENTE: LEZIONE DI MER-
COLEDÌ 11 NOVEMBRE.

SAPPIAMO ANCHE CHE $e^x > 0$ PER OGNI x . PRESO DUNQUE $y > 0$,

CI CHIEDIAMO SE ESISTE UN $x \in \mathbb{R}$ TALE CHE $e^x = y$ (VE-

DERE LA LEZIONE DEL 10/11).

LA RISPOSTA È AFFERMATIVA IN VIRTÙ' DEL TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI. PRESO $y > 0$, SICCOME $e^x \rightarrow 0$, RISULTA

$e^x < y$ PER OGNI $x < N_1$, FIS-
SO QUINDI UN PUNTO $a < N_1$ CO-
SICCHÉ $f(a) = e^a < y$. SICCO-

ME $e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, RISULTA

$e^x > y$ PER OGNI $x > N_2$ E

PERCIÒ PRENDO $b > N_2$ COSIC-
CHÉ $f(b) = e^b > y$. LA FUN-

ZIONE $f(x) = e^x$ SODDISFA IN
[a, b] LE IPOTESI DEL TEOREMA

DEI VALORI INTERMEDI:

$f \in C^0([a, b])$ E

$f(a) < y < f(b)$.

IL TEOREMA DEI VALORI INTER-
MEDI ASSICURA L'ESISTENZA DI
ALMENO UN $x \in [a, b]$ TALE CHE

$$e^x = y.$$

QUANTE SONO LE SOLUZIONI DI-
STINTE DI QUESTA EQUAZIO-
NE? UNA SOLA. PUÒ ESSERE

$$e^{x_1} = e^{x_2}$$

CON $x_1 < x_2$? NO PER-
CHÉ $f(x)$ È STRETTAMENTE
CRESCENTE.

RIEPILOGO: PER OGNI $y > 0$ E-
SISTE UN UNICO $x \in \mathbb{R}$ TALE CHE

$$e^x = y$$

QUINDI RESTA DEFINITA UNA FUN-
ZIONE $g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

NEL RISPETTO DELLA DEFINIZIONE
DI FUNZIONE. QUESTA FUNZIONE
SI CHIAMA FUNZIONE LOGARITMI-
CA E SI INDICA CON $g(y) = \log y$.

ESSA È CONTINUA IN VIRTÙ' DEL TEORE-
MA SULLA CONTINUITÀ' DELLA FUN-
ZIONE INVERSA DI UNA DATA FUN-
ZIONE CONTINUA E STRETTAMEN-
TE CRESCENTE SU DI UN DATO IN-
TERVALLO.

FUNZIONE INVERSA DI UNA FUNZIONE DATA

ATTENZIONE: NON TUTTE LE FUNZIONI HANNO UNA FUNZIONE INVERSA!

CONSIDERIAMO UNA FUNZIONE f AVENTE PER DOMINIO UN INTERVALLO I , E CONSIDERIAMO L'INSIEME $\mathcal{Z}_m f = f(I)$ DEI VALORI ASSUNTI DALLA FUNZIONE. SE PER OGNI $y \in \mathcal{Z}_m f$ ESISTE UN UNICO $x \in I$ TALE CHE

$$f(x) = y \text{ ALLORA } f \text{ SI}$$

DICE INIETTIVA, O INVERTIBILE, E RESTA DEFINITA LA FUNZIONE $x = g(y)$ DETTA IN-

VERSA DI f . PERCIÒ SI PUÒ SCRIVERE

$$f(g(y)) = y.$$

OVVERO

$$f \circ g = \text{id}$$

GI 3 DIC 2020

PRENDENDO A PRESTITO LA NOTAZIONE DALL'ALGEBRA, LA FUNZIONE INVERSA $g(y)$ DI UNA FUNZIONE INVERTIBILE $f(x)$ SI PUÒ

INDICARE CON $g(y) = f^{-1}(y)$

O SEMPLICEMENTE $g = f^{-1}$.

LE PRINCIPALI PROPRIETÀ DEL LOGARITMI

1) PRENDIAMO $y_1, y_2 > 0$.

ESISTONO $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ TALI CHE

$$e^{x_1} = y_1 \quad \text{E} \quad e^{x_2} = y_2.$$

MOLTIPLICANDO MEMBRO A MEMBRO LE DUE UGUAGLIANZE, TROVIAMO

$$e^{x_1 + x_2} = y_1 y_2.$$

PER LA DEFINIZIONE DEL LOGARITMO, POSSIAMO SCRIVERE

$$\begin{aligned} \log y_1 y_2 &= x_1 + x_2 \\ &= \log y_1 + \log y_2 \end{aligned}$$

SIMILMENTE, DIVIDENDO MEMBRO A MEMBRO SI TROVA

$$e^{x_1 - x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

QUINDI, PER LA DEFINIZIONE DEL LOGARITMO, POSSIAMO SCRIVERE

$$\begin{aligned} \log \frac{y_1}{y_2} &= x_1 - x_2 \\ &= \log y_1 - \log y_2 \end{aligned}$$

2) PRENDIAMO $y > 0$. SAP-
PIAMO CHE ESISTE UN UNI-
CO $x \in \mathbb{R}$ TALE CHE

$$e^x = y.$$

PER OGNI $\alpha \in \mathbb{R}$ RISULTA QUIN-

$$\text{DI } (e^x)^\alpha = e^{\alpha x} = y^\alpha.$$

PER LA DEFINIZIONE DEL LOGA-
RITMO, POSSIAMO SCRIVERE

$$\begin{aligned} \log y^\alpha &= \alpha x \\ &= \alpha \log y \end{aligned}$$

PROBLEMI [204]

1) IL DOMINIO DELLA FUNZIONE

$$f(x) = x + 1 - e^{\log x}$$

È L'INTERVALLO $(0, +\infty)$.

PER OGNI $x \in (0, +\infty)$ SUS-
SISTE L'UGUAGLIANZA

$$e^{\log x} = x$$

IN VIRTÙ DI QUESTA UGUAGLIAN-
ZA, POSSIAMO SCRIVERE

$f(x) = x + 1 - x$ PER O-
GNI $x > 0$, E QUINDI $f(x) =$
1 PER OGNI $x > 0$.

ME 2 DIC 2020

2) IL DOMINIO DELLA FUNZIONE

$g(x) = 1 - \log(e^x)$ È L'IN-
TERVALLO $(-\infty, +\infty)$. INOLTRE

IL $\log(e^x)$ È UGUALE AD x

PER LA DEFINIZIONE DEL LOGARITMO.

QUINDI POSSIAMO SCRIVERE $g(x) =$

$1 - x$ PER OGNI $x \in \mathbb{R}$.

IL GRAFICO DI $g(x) = 1 - x$ È
IL SEGUENTE (È UNA RETTA)

GI 3 DIC 2020

3) POSTO $t = e^x > 0$,

L'UGUAGLIANZA DATA DIVENTA

$$\frac{t - \frac{1}{t}}{2} = y$$

CHE SI PUÒ RISCRIVERE NELLA FORMA

$$t^2 - 2yt - 1 = 0$$

E QUESTA È UN'EQUAZIONE DI SE-
CONDO GRADO LA CUI UNICA SOLU-
ZIONE POSITIVA È

$$e^x = t = y + \sqrt{y^2 + 1}$$

$$> y + \sqrt{y^2} = y + |y| \geq 0$$

E DA QUI RICAVIAMO

$$x = \log \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right)$$

$$= \text{seth} \sinh y$$

$$= \sinh^{-1} y$$

CON NOTAZIONE ISPIRATA ALL'AL-
GEBRA.